

Resultaten Kwaliteitsstudie
gepresenteerd tijdens
de eerste landelijke bijeenkomst
van en voor NVS-dragers en
direct betrokkenen op
24 maart 2007
te Utrecht

door
mevrouw J.J. Ardesch
neuroloog i.o./promovendus NVS
Medisch Spectrum Twente

Resultaten*

- Bij 69% zijn de aanvallen verminderd met 50% of meer
- Bij 62% zijn de aanvallen minder heftig
- Bij 54% is de verwardheidsperiode korter

* Kwaliteitsstudie na 1 jaar

Resultaten

Alertheid	42% beter
Verbale communicatie	25% beter
Geheugen	21% beter
School/werk	42% beter
Vrolijker	33% beter
Cluster	33% beter
Tevreden over NVS	64%

Resultaten

- Aanvals vermindering neemt toe in de tijd
- Geen vermindering, wel minder heftig
- Verbetering kwaliteit van leven
- *Geen vermindering: Stoppen?*

Resultaten

- Medicijnen:
 - Minder medicatie nodig ter couperen aanval
 - Weinig patiënten met vermindering van standaard medicijnen

Magneet

- Gebruikt door patiënt/verzorgers/ouders/partners
- 90% gebruikt de magneet
 - Bij 12 % altijd effectief
 - Bij 50% meestal effectief
 - Bij 31% soms effectief
 - Minder aanvallen
 - Sneller uit de aanval
 - Verwardheids periode korter

Bijwerkingen

<i>Bijwerking</i>	<i>Na 1 maand</i>	<i>Na 12 maanden</i>
Hees	51%	33%
Tintelingen	10%	0%
Keelknijpen	25%	15%

Bijwerkingen

- Wat doet de stroom* op andere organen?
 - Stem: hees, hoesten
 - Keel: prikkeling, keelpijn, slikken
 - Maag: zuurbranden, misselijk
 - Hart: vertraging hartslag
 - Long: benauwdheid

- * Het is het signaal veroorzaakt door de stroom die voortgaat naar een eind-orgaan, de stroom zelf niet.

Vragen over NVS / Contacten met NVS-dragers of betrokkenen

Informatiepunt/Kenniscentrum

Epilepsie Vereniging Nederland

www.epilepsievereniging.nl

> 'NVS'

Bezoek de 'Contactgroep' of bel

telefoon: 0318-672 772